



Covid19-Rheuma.de

Daten der Impfumfrage

Stand 12.01.2022

COVID-19-Impfung & Rheuma

Liebe Patientinnen und Patienten,

Sie leiden an Rheuma & sind bereits geimpft?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen zur COVID-19-Impfung mit uns und helfen Sie uns, weitere Erkenntnisse aus der Pandemie zu gewinnen. Wir begleiten Sie über einen Zeitraum von ca. 12 bis 24 Wochen (abhängig vom Impfstoff) mit kurzen Umfragen. Eine letzte Umfrage folgt nach 12 Monaten.


Zur Umfrage gelangen Sie über den QR-Code oder den Link:

<https://www.covid19-rheuma.de/patienten-information-impfung>




Bis zum 12.01.2022 haben 2771 Personen teilgenommen


Altersverteilung




Geschlechter




Bundesländer



Diagnose der Erkrankung (n=2771)




Antirheumatische Medikation (n=2771)



*Mehrfachauswahl möglich

Impfstoffe bei Erstimpfung (n=2771)



Nebenwirkungen & Rheumaschub nach 1. Impfung

Nebenwirkungen nach COVID-19-Impfung		
Schmerzen an Einstichstelle	1927	70%
Müdigkeit	1141	41%
Kopfschmerzen	863	31%
Gelenkschmerzen	661	24%
Schüttelfrost	408	15%
Andere	380	14%
Übelkeit	270	10%
Fieber	207	8%
Bauchschmerzen	87	3%
Allergische Reaktion	39	1%
Keine	458	17%
Schwerwiegende Nebenwirkungen		
Ponsinfarkt (RA ohne Immunmodulation)	1	
Thrombose	3	
Herpes zoster	3	
Periphere Neuritis mit Parese linkes Bein	1	
Akute eosinophile Ösophagitis	1	
Guillain-Barré-Syndrom-Reaktivierung	1	
Facialisparese	1	

Zunahme Entzündungsaktivität nach COVID-19-Impfung	427	15%
Stärke des Schubes	6	0-10



Änderung der Immunmodulation aufgrund des Schubes (n=427)		
Nein	180	42%
Gering (Einsatz von NSAR/ ≤ 5 mg Prednisolon/Tag)	107	25%
Mehr als 5 mg Prednisolon/Tag	78	18%
Neue Immunmodulation	34	8%
Neue Kombinationstherapie	28	7%